

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПЕРБІГУ ГЕРПЕТИЧНОЇ ІНФЕКЦІЇ

ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ

Бойчунь В.О., магістр

Науковий керівник – доц. Сумцов Г.О.

СумДУ, медичний інститут,

кафедра сімейної медицини з курсом ендокринології

Обстежено 45 вагітних жінок на базі СОЦАГР. Серед них 30 вагітних високого інфекційного ризику розвитку внутрішньоутробної інфекції, визначеному за даними анамнезу, гестаційними ускладненнями при теперішній вагітності і лабораторним підтвердженням інфікування ВПГ-2 (основна група). В контрольну групу увійшли 15 вагітних з обтяженим АГА, але з фізіологічним перебігом теперішньої вагітності і відсутністю герпетичного інфікування.

У 18 ($60 \pm 9\%$) жінок основної групи виявлена хронічна герпетична інфекція в стадії ремісії, у 10 ($33 \pm 9\%$) під час вагітності відбулось загострення хронічно-рецидивуючого герпесу, безсимптомний перебіг герпетичної інфекції відмічено у 10 ($33 \pm 9\%$). Первинне інфікування виявлено у двох ($7 \pm 5\%$) жінок. Ускладнення гестаційного процесу спостерігалось у 23 ($76 \pm 8\%$) вагітних основної і у 4 ($27 \pm 12\%$) контрольної групи.

Перебіг вагітності супроводжувався загрозою переривання в різні терміни у 19 ($63 \pm 9\%$) вагітних основної і у 3 ($20 \pm 11\%$) контрольної групи. У обстежених жінок основної і контрольної групи спостерігались відповідно такі ускладнення: анемія у 10 ($33 \pm 9\%$) і 4 ($27 \pm 12\%$), цервіцити і кольпіти у 20 ($67 \pm 9\%$) і 3 ($20 \pm 11\%$), преєклампсія у 4 ($13 \pm 6\%$) і одної ($7 \pm 7\%$), ОРВІ у 13 ($44 \pm 9\%$) і двох ($13 \pm 9\%$), загострення хронічних соматичних інфекційних захворювань (тонзиліт, бронхіт, цистит, пієлонефрит) у 9 ($30 \pm 9\%$) і одної ($7 \pm 7\%$), ознаки плацентарної недостатності виявлені у 15 ($50 \pm 9\%$) і одної ($7 \pm 7\%$); ЗВРП у 4 ($13 \pm 6\%$) і одної ($7 \pm 7\%$); ускладнений перебіг пологів у 17 ($56 \pm 9\%$) і двох ($13 \pm 9\%$), з них передчасне відходження навколоплідних вод у 10 ($33 \pm 9\%$) і двох ($13 \pm 9\%$); гіпоксія плоду у 10 ($33 \pm 9\%$) і одної ($7 \pm 7\%$) випадків. Тільки у вагітних основної групи діагностувалось багатоводдя у 6 ($20 \pm 7\%$), маловоддя у двох ($7 \pm 5\%$), викидні в різні терміни у двох ($7 \pm 5\%$), передчасні пологи у 4 ($13 \pm 6\%$) випадках.

По причинах різних ускладнень, в основному через внутрішньоутробну гіпоксію плоду, родорозрішення операцією кесарського розтину проведено в 9 ($30 \pm 9\%$) основної; і у одному ($7 \pm 7\%$) випадку контрольної групи.

Таким чином, у жінок, інфікованих ВПГ-2, кількість ускладнень під час вагітності і пологів вище, ніж у практично здорових. Приведені дані підтверджують роль герпетичної інфекції вагітних при формуванні гестаційних ускладнень.